

Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 7/2017

Chaves, 29 de Maio de 2017

CASTANHEIRO

ATENÇÃO!

VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO



- Insecto adulto em tamanho ampliado.
- Tamanho médio real é de 2,5 a 3 mm.

Devem continuar a observar cuidadosamente os seus castanheiros, e caso observem sintomas (bugalhos/galhas) semelhantes aos das fotografias, deverão retirá-las de imediato e destruí-las, através do fogo ou enterrando-as.



Deverão também comunicar aos Serviços Regionais de Agricultura mais próximos ou a esta Estação de Avisos.

NÃO DEIXE QUE ESTA PRAGA SE INSTALE NOS SEUS CASTANHEIROS E DESTRUA A PRODUÇÃO!

VINHA

Míldio

As condições climáticas que se fizeram sentir, criaram condições favoráveis à formação de novas infecções de míldio, nas vinhas da região.

Aconselhamos, por isso, os Srs. Agricultores a manterem a vinha protegida contra esta doença, fazendo um tratamento com um produto sistémico.

(consultar lista anexa à circular anterior)

Oídio

As condições climáticas são também favoráveis ao desenvolvimento desta doença, sendo por isso necessário proteger a vinha contra este fungo, realizando um tratamento com um produto da lista anexa à Circular anterior.

NOTA

Devido à fase de franco desenvolvimento da vinha, deve optar por realizar um tratamento com um produto sistémico, seleccionado da lista anexa à Circular nº 6, que combata em simultâneo o míldio e o oídio.

BATATEIRA

Míldio

O estado do tempo tem decorrido favorável ao aparecimento de infecções de míldio, pelo que, deve continuar a proteger o seu batatal, com um produto sistémico da lista em anexo à Circular anterior.